

Description: Panadol Rapide LEAFLET (Czech)	Colours:	Approved by:
Code Ref: L603105/02	■ PMS 2765	
Size: 150 x 210 mm	■ Varnish	
Proof No: 1		Date:
Country: Greece		25.1.2008
Date: Jan. 14, 2008		
Time: 09:53 a.m.		
FRONT SIDE		



(Paracetamol) Šumivé tablety k vnitřnímu užití

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce: • GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Irsko
• Famar S.A., Attiki, Recko



Složení:
Léčivá látka: Paracetamol 500 mg v jedné šumivé tabletě.

Pomocné látky: Sorbitol, dihydrát sodné soli sacharinu, hydrogenuhličitán sodný, povidon, natrium-lauryl-sulfát, dimetikon, kyselina citronová a uhličitán sodný.
Šumivá tableta obsahuje 427 mg sodíku.

Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum

Charakteristika: Panadol Rapide obsahuje paracetamol, lék proti bolesti i horečce. Panadol Rapide nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.



Indikace: Panadol Rapide šumivé tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení i bolesti v krku a snižuje horečku. Je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.



Kontraindikace: Přecitlivělost na paracetamol je velmi vzácná, při známé přecitlivělosti na paracetamol nebo některou další složku přípravku neužívejte. Pacienti léčící se pro onemocnění jater se o vhodnosti užívání přípravku musí předem poradit s lékařem. Přípravek se nesmí užívat při žloutence, chronickém pití alkoholu a při současném podávání léků poškozujících játra. Vzhledem k obsahu léčivé látky nejsou Panadol Rapide šumivé tablety vhodné pro děti mladší než 6 let. Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné užívat přípravek 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.



Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky u tohoto přípravku jsou výjimečné. Při případném výskytu nežádoucích účinků (kožní vyrážka) nebo jiné neobvyklé reakce přestaňte přípravek užívat a poradte se o dalším užívání s lékařem.



Interakce: Závažné lékové interakce jsou u paracetamolu výjimečné. Současné užívání Panadolu Rapide s některými léky na spaní, proti epilepsii, některými antibiotiky nebo pitím alkoholu může vést v někte-

ných případech k poškození funkce jater.

V případě, že užíváte jiné léky (na předpis i bez něj), poraďte se o současném užívání Panadolu Rapide s lékařem. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Panadol Rapide šumivé tablety.



Dávkování a způsob použití: Dospělí a mladiství: 2 tablety rozpuštěné ve sklenici vody dle potřeby až 4x denně. Současné užití 2 tablet přípravku zvyšuje rychlost vstřebávání a tím i rychlost účinku. Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka je 2 šumivé tablety.

Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.
Děti 6-12 let: 1/2 tablety rozpuštěné ve sklenici vody nejvýše 3x denně. Jednotlivé dávky opakujte s odstupem nejméně 6 hodin.
Děti 12-15let: 1 tableta rozpuštěná ve sklenici vody nejvýše 3x denně s odstupem nejméně 6 hodin.

Nepřekračujte doporučené dávkování.



Upozornění: Každá tableta obsahuje 427 mg sodíku. V případě, že držíte dietu s nízkým obsahem sodíku, přípravek neužívejte.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Pokud nedojde u horečnatých onemocnění do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte proti bolesti nejdéle 7 dnů, u dětí 3 dny, neurčí-li lékař jinak. Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky. Může dojít k selhání funkce jater.



Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Lék uložte mimo dosah dětí.



Balení: 12 nebo 24 šumivých tablet

Datum poslední revize: 10.9.2003